

Pitavastatin/Ezetimibe

商品名	中文商品名	含量
Tonvasca	同抑脂膠囊	2/10毫克

作用：降血脂藥物。

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 對任何藥物、食物或物質過敏。
2. 已懷孕、計畫懷孕或哺乳者。
3. 若您重症肌無力、有糖尿病、肝腎功能不全等疾病。
4. 若您正在使用任何其他藥物(含中草藥，健康食品)，如：免疫抑制劑(Cyclosporine)、抗生素(Erythromycin)、抗結核藥(Rifampin)、其他降血脂藥(Gemfibrozil)、痛風藥(Colchicine)、抗凝血劑(Warfarin)等。

正確服藥及儲存方法：

1. 飯前飯後服用均可。
2. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間就不必補服，切記不可補服兩倍劑量。
3. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

注意事項：

1. 請避免喝酒，或其他酒精性飲料。
2. 若用藥期間懷孕，請立刻停用並告知醫師；另外，用藥期間請勿哺乳。
3. 藥物可能造成記憶力衰退等輕微認知障礙，這類症狀，通常停藥後可恢復，若有出現疑似症狀，可徵詢療人員。
4. 藥物可能造成血糖波動，若您有糖尿病需更小心監測血糖。

可能發生之副作用：

1. 噁心感、便秘或拉肚子。
2. 手或腳的肌肉痠痛、背痛。
3. 少數人可能會肝功能指數上升。

若您服藥後有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 懷疑藥物服用過量中毒。
2. 出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、呼吸或說話困難、嗓音異常嘶啞，或口、臉部、舌頭或喉嚨腫脹、吞嚥困難。
3. 嚴重肌肉疼痛、虛弱或無力。
4. 尿液顏色很深、糞便顏色變很淺、沒有食慾、持續腹部疼痛、眼睛或皮膚發黃。
5. 血尿、血便或黑便、吐血或吐出咖啡渣狀的嘔吐物、不明原因的瘀青、異常出血情形或血流不止。
6. 有異常的燒灼、發麻或刺痛感。
7. 無法排尿、排尿量改變，或排尿時感到疼痛、血尿。
8. 想法或思考邏輯方面有明顯的改變。
9. 情緒異常低落、或有疑似憂鬱症的情形。
10. 任何其他嚴重不適。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話：3422121-76111、76114(門診藥局)

3422121-76104(藥物資訊中心)

202508 修訂