

Bempedoic Acid

商品名	中文商品名	含量
Nilemdo	寧脂德膜衣錠	180毫克

作用：降血脂藥物

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 對任何藥物、食物或物質過敏。
2. 已懷孕、計畫懷孕者或哺乳者。
3. 若您有肝腎功能不全、曾有肌腱斷裂等肌腱疾病、痛風或高尿酸血症病史、貧血、乳糖不耐症等疾病。
4. 若您正在使用任何其他藥物(含中草藥、健康食品)，如：其他降血脂藥(Simvastatin)、抗生素(Ciprofloxacin)、類固醇等。

正確服藥及儲存方法：

1. 隨餐或空腹口服使用均可。
2. 請整粒吞服，勿將錠劑剝開、磨粉或咬碎。
3. 忘記服藥，請儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服用兩倍劑量。
4. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

注意事項：

1. 服藥期間請配合醫師指示之飲食、運動計畫，並定期接受抽血檢查。
2. 用藥期間若發現懷孕，請立刻停藥並告知醫師；用藥期間，禁止哺乳。
3. 藥物有導致貧血的案例，在確認藥物對您的影響前請避免駕駛或操作危險器具。
4. 服藥期間，如有痛風發作，回診時請告知醫師。
5. 如果關節發生不明原因的瘀青、腫脹或撕裂感，請盡快就醫或回診。

可能發生之副作用：

1. 尿酸升高。
2. 四肢疼痛。
3. 貧血。
4. 肝指數上升。

若您服藥後有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 懷疑藥物服用過量中毒。
2. 出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、呼吸或說話困難、嗓音異常嘶啞，或口、臉部、舌頭或喉嚨腫脹、吞嚥困難。
3. 大拇指腳趾或任何其他關節疼痛、發紅、發熱、觸痛、僵硬或腫脹。
4. 上腹部右側部位、右側肩膀部位，或者肩胛骨間突然疼痛；皮膚或眼睛出現黃疸症狀；或者發燒且寒顫。
5. 異常疲勞、食慾不振、噁心嘔吐、黃疸（皮膚或眼睛變黃）、腹脹、右上腹疼痛，以及深色尿液或淺色糞便。
6. 腳踝後側、肩膀、手臂或其他關節出現疼痛、瘀傷或腫脹的情況。
7. 無法排尿或排尿量改變，血尿、排尿疼痛或有灼熱感。
8. 貧血。
9. 任何其他嚴重不適。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部謹製

服務電話：3422121-76111、76114(門診藥局)

3422121-76104(藥物資訊中心)

202509 修訂