

## Acamprosate

商品名	中文商品名	含量
Acamprosate	(無)	333 毫克

作用：戒酒的輔助治療。

### 使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 對任何藥物、食物或物質過敏。
2. 已懷孕、計畫懷孕或哺乳者。
3. 若您有肝腎功能不全、高血鈣、其他藥物濫用或有自殺傾向及憂鬱症等健康狀況。
4. 若您正在使用任何其他藥物(含中草藥，健康食品)。

### 正確服藥及儲存方法：

1. 藥品應在酒癮戒斷期後，達成戒酒時盡快開始使用。
2. 飯前飯後服用均可。若一天服用三次，可配合用餐時間一起使用。
3. 請吞服整顆藥錠，請勿剝半或磨粉。
4. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間就不必補服，切記不可補服兩倍劑量。
5. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

### 注意事項：

1. 此藥品無法消除或緩解戒斷症狀。
2. 治療期間患者可能出現憂鬱或自殺傾向的狀況，照護者須多加留意。
3. 育齡女性於服藥期間至結束治療後一週內，請妥善避孕；且用藥期間不建議哺乳。

### 可能發生之副作用：

1. 腹瀉、噁心。
2. 焦慮、失眠、憂鬱。

### 若您服藥後有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 懷疑藥物服用過量中毒。
2. 出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、呼吸或說話困難、嗓音異常嘶啞，或口、臉部、舌頭或喉嚨腫脹、吞嚥困難。
3. 出現憂鬱症、神經緊張、心神不定、抱怨不休、恐慌症發作，或情緒或行為產生其他變化或較以往更為嚴重的情況。
4. 酒癮復發。
5. 任何其他嚴重不適。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期，以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話：3422121-76111、76114(門診藥局)

3422121-76104(藥物資訊中心)

202508 修訂