

Larotrectinib

商品名	中文商品名	含量
Vitrakvi	維泰凱膠囊	100 毫克

作用：抗腫瘤製劑。

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 對任何藥物、食物或物質過敏。
2. 已懷孕、計畫懷孕或哺乳者。
3. 若您有肝功能不全。
4. 若您正在使用任何其他藥物(含中草藥，健康食品)，如：抗生素(Clarithromycin)、抗黴菌藥(Itraconazole)、抗病毒藥(Ritonavir)、抗癲癇藥(Phenytoin、Carbamazepine)等。

正確服藥及儲存方法：

1. 飯前飯後服用均可。
2. 請吞服整顆膠囊，請勿咀嚼或弄碎膠囊。
3. 若服藥後嘔吐，請勿補服，在排定時間服用下一劑藥物。
4. 忘記服藥，儘快補服；若離下次服藥時間不足6小時，就不必補服，切記不可一次使用兩倍劑量。
5. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

注意事項：

1. 避免食用葡萄柚、柚子或其果汁。
2. 用藥期間到服用最後一劑後1周內，無論性別，請做好避孕措施並避免哺乳。
3. 藥物可能影響女性生育能力，若有需要請先告知醫師。

可能發生之副作用：

1. 肝指數上升。
2. 貧血。
3. 肌肉骨骼痛。
4. 疲倦、頭暈。
5. 咳嗽。

若您服藥後有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 懷疑藥物服用過量中毒。
2. 出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、呼吸或說話困難、嗓音異常嘶啞，或口、臉部、舌頭或喉嚨腫脹、吞嚥困難。
3. 尿液暗色、感到疲倦、食慾降低、胃部不適或胃痛、大便淡色、嘔吐，或者皮膚或眼睛泛黃。
4. 肌肉痙攣或抽筋、麻木或刺痛感，或者癲癇發作。
5. 記憶力減退、精神錯亂、注意力衰退、譫妄、情緒障礙(焦慮、憂鬱、躁動)、嚴重頭暈頭痛、嚴重睡眠障礙。
6. 骨頭疼痛、行走困難。
7. 四肢水腫
8. 任何其他嚴重不適。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話：3422121-76111、76114(門診藥局)

3422121-76104(藥物資訊中心)

202506 修訂