

## Ezetimibe

商品名	中文商品名	含量
Ezetity	怡優脂錠	10 毫克

作用：降血脂製劑。

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 對任何藥物、食物或物質過敏。
2. 已懷孕、計畫懷孕或哺乳者。
3. 若您有肝功能不全。
4. 若您正在使用任何其他藥物(含中草藥，健康食品)，如：免疫調節劑(cyclosporine)、降血脂藥(gemfibrozil、fenofibrate)、抗凝血劑(Warfarin)等。

正確服藥及儲存方法：

1. 可以空腹或與食物一起服用(飯後)；請盡量在每天的同一時間服用。
2. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間就不必補服，切記不可補服兩倍劑量。
3. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

注意事項：

1. 服用Ezetimibe前4小時或服用後2小時內，請勿服用colestipol或cholestyramine等降膽酸藥(一種降膽固醇的藥)。
2. 請按醫師指示，定期接受抽血檢查。
3. 請配合醫師建議的飲食及運動計畫。

可能發生之副作用：

1. 腹瀉、腹痛或脹氣。
2. 感覺疲倦或虛弱、頭痛。
3. 上呼吸道感染。
4. 關節痛。

若您服藥後有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 懷疑藥物服用過量中毒。
2. 出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、呼吸或說話困難、嗓音異常嘶啞，或口、臉部、舌頭或喉嚨腫脹、吞嚥困難。
3. 嚴重肌肉疼痛、虛弱或無力。
4. 尿液顏色很深、糞便顏色變很淺、沒有食慾、持續腹部疼痛、眼睛或皮膚發黃。
5. 血尿、血便或黑便、吐血或吐出咖啡渣狀的嘔吐物、不明原因的瘀青、異常出血情形或血流不止。
6. 任何其他嚴重不適。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話：3422121-76111、76114(門診藥局)

3422121-76104(藥物資訊中心)

202506 修訂